

## Exercices - Groupes - corrigés

Ex 1.1 on a :

$$bab = (a^{-1}) (bab) = a \underbrace{(a^{-1}ba)}_{=b^{-1}} b = ab^{-1}b = a$$

$$\text{et } aba = (b^{-1}) (aba) = b \underbrace{(b^{-1}ab)}_{=a^{-1}} a = ba^{-1}a = b.$$

$$\text{d'où } ab = (bab)(aba) = b \underbrace{(aba)}_{=b} ba = b^3a$$

$$\text{et } ba = (aba)(bab) = a \underbrace{(bab)}_{=a} ab = a^3b$$

Donc

$$a = \underbrace{bab}_{=b^3} a = b^4a \quad \text{et} \quad b = \underbrace{aba}_{=a^3} b = a^4b.$$

Puis, il vient  $b^4 = e$  et  $a^4 = e$

Ex 1.2 D'après l'associativité de loi du groupe  $G$ , on a

$$\begin{aligned} (ab)^n &= \underbrace{(ab) \cdot (ab) \cdot \dots \cdot (ab)}_{n \text{ termes}} \\ &= a \underbrace{(ba) (ba) \dots (ba)}_{n-1 \text{ termes}} b = a (ba)^{n-1} b \end{aligned}$$

Comme  $(ab)^n = e$ , alors  $a (ba)^{n-1} b = e$  et dmc

$$a^{-1} [a (ba)^{n-1} b] b^{-1} = a^{-1} b^{-1}$$

$$\text{d'où } (ba)^{n-1} = a^{-1} b^{-1} = (ba)^{-1}$$

$$\text{d'où } (ba) (ba)^{n-1} = (ba) (ba)^{-1} = e.$$

$$\text{Dmc } (ba)^n = e$$

Ex 1.3 À vérifier en exercice que la loi  $*$  est associative, d'élément neutre  $e = (1, 0)$  et que le symétrique de tout  $(x, y) \in G = \mathbb{R}_*^+ \times \mathbb{R}$  est l'élément  $(\frac{1}{x}; -\frac{y}{x})$ .

**Ex 1.4** # Soit  $e$  l'élément neutre de  $G$ , on a :

$$ea = a = ae$$

d'où  $e \in H_a$  et donc  $H_a \neq \emptyset$

# Soient  $x$  et  $y$  quelconques de  $H_a$ , on a

$$\begin{aligned} (xy)a &= x(ya) && \text{(par associativité)} \\ &= x(ay) && \text{(puisque } y \in H_a) \\ &= (xa)y && \text{(par associativité)} \\ &= (ax)y && \text{(puisque } x \in H_a) \\ &= a(xy) && \text{(par associativité)} \end{aligned}$$

d'où  $xy \in H_a$ .

# Soit  $x$  quelconque de  $H_a$ , on a :

$$xa = ax$$

$$\begin{aligned} \text{d'où} \quad x^{-1}(xa) &= x^{-1}(ax) \\ \text{d'où} \quad (x^{-1}x)a &= (x^{-1}a)x && \text{(puisque } x^{-1}x = e) \end{aligned}$$

$$\text{d'où} \quad a = (x^{-1}a) \cdot x$$

$$\text{d'où} \quad ax^{-1} = (x^{-1}a)(xx^{-1}) \quad \text{(puisque } xx^{-1} = e)$$

$$\text{d'où} \quad ax^{-1} = x^{-1}a$$

donc  $x^{-1} \in H_a$

Finalement, on conclut que  $H_a$  est un sous-groupe de  $G$ .

**Ex 1.5** • 1 désigne l'élément neutre de  $G$ , on a.

$$\# \quad 1^n = \underbrace{1 \cdot 1 \dots 1}_{n \text{ fois}} = 1 \quad \text{d'où } 1 \in R_n \text{ et donc } R_n \neq \emptyset.$$

# Soient  $a$  et  $b$  quelconques de  $R_n$ , alors on a

$$\begin{aligned} (ab^{-1})^n &= a^n (b^{-1})^n && \text{(puisque } G \text{ est commutatif)} \\ &= (b^{-1})^n && \text{(puisque } a^n = 1 \text{ (} a \in R_n)) \\ &= (b^n)^{-1} \\ &= 1 && \text{(puisque } b^n = 1 \text{ (} b \in R_n)) \end{aligned}$$

Donc  $ab^{-1} \in R_n$

et alors  $R_n$  est un sous-groupe de  $G$

**Ex 1.6** À vérifier en exercice.

**Ex 1.7** si  $A \subset B$  ou  $B \subset A$ , on a

$$A \cup B = B \text{ ou } A \cup B = A$$

et donc  $A \cup B$  est un sous-gpe de  $G$

Inversement, soit  $A \cup B$  sous-gpe de  $G$  et supposons

par l'absurde que  $A \not\subset B$  et  $B \not\subset A$

c.à-dire  $(\exists x \in A); x \notin B$  et  $(\exists y \in B); y \notin A$

d'où  $x \in A \subset A \cup B$  et  $y \in B \subset A \cup B$ .

Comme  $A \cup B$  est un sous-gpe de  $G$ , alors

$$xy \in A \cup B$$

d'où  $xy \in A$  ou  $xy \in B$ .

Alors si  $xy \in A$ ,  $A$  est un sous-gpe alors

$$y = \underset{\substack{\uparrow \\ A}}{x} \underset{\substack{\uparrow \\ A}}{(xy)} \in A \text{ absurde}$$

si  $xy \in B$ ,  $B$  est un sous-gpe contenant  $y^{-1}$  et  $(xy)$ , alors

$$x = (xy) y^{-1} \in B \text{ absurde}$$

Finalement, on a

$$A \cup B \text{ sous-gpe de } G \iff A \subset B \text{ ou } B \subset A.$$

**Ex 1.8** À vérifier en exercice

**Ex 1.9** Puisque  $f$  est un morphisme de gpes, alors  $f(G)$  est un sous-gpe de  $G'$ . Soient  $x$  et  $y$  quelconque de  $G$ , on a

$$f(x)f(y) = f(y)f(x) \Leftrightarrow f(ny) = f(yx) \quad (\text{puisque } f \text{ morphisme})$$

$$\Leftrightarrow f(ny) (f(yx))^{-1} = e' \quad (e' \text{ \'element neutre de } G')$$

$$\Leftrightarrow f(ny) f(yx^{-1}) = e'$$

$$\Leftrightarrow f(ny) f(x^{-1}y^{-1}) = e' \quad (\text{car } yx^{-1} = x^{-1}y^{-1})$$

$$\Leftrightarrow f(nyx^{-1}y^{-1}) = e'$$

$$\Leftrightarrow nyx^{-1}y^{-1} \in \text{Ker}(f)$$

Donc  $(f(G), \cdot)$  est commutatif si et seulement si

$$\forall n, y \in G; \quad nyx^{-1}y^{-1} \in \text{Ker}(f) \quad \text{c-à-dire} \quad C \subset \text{Ker}(f)$$

Or  $\text{Ker}(f)$  est un sous-gpe de  $G$  et donc

$$Gr(G) \subset \text{Ker}(f)$$

Conclusion :

$$(f(G), \cdot) \text{ commutatif} \Leftrightarrow Gr(G) \subset \text{Ker}(f).$$

**EX 1.10** À faire en exercice.

**EX 1.12** À vérifier en exercice.

**EX 1.B.1** Le nombre d'inversions pour  $\sigma$  est

$$6 + 4 + 4 + 1 + 2 + 1 = 18$$

... d'où sa signature est

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^{18} = 1$$

c'est une permutation paire.

2) Il suffit de vérifier que

$$\sigma\sigma' = \tau_{25} \quad \text{et} \quad \sigma'\sigma = \tau_{34}$$

**Ex 1.14** # On vérifie que

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 7 & 5 & 6 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

et une décomposition de  $\sigma$  au produit de cycles disjoints est


$$\sigma = (1, 2, 3, 7) \circ (4, 5, 6)$$

d'où la signature de  $\sigma$  est -

$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma) &= \varepsilon(1, 2, 3, 7) \times \varepsilon(4, 5, 6) \\ &= (-1)^{4-1} \times (-1)^{3-1} \\ &= -1. \end{aligned}$$

# Une autre manière, consiste à remarquer que

$$\begin{aligned} \sigma &= (1, 3, 7, 2) \circ (4, 5, 1) \circ (6, 1, 5, 3, 7) \circ (1, 3, 5, 7, 2) \\ &= \underbrace{(1, 3, 5, 7, 2)}_{=\sigma_1} \circ \underbrace{(6, 1, 5, 3, 7)}_{=\sigma_2} \circ \underbrace{(4, 5, 1)}_{=\sigma_3} \circ \underbrace{(1, 3, 7, 2)}_{=\sigma_4} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{d'où } \varepsilon(\sigma) &= \varepsilon(\sigma_1) \times \varepsilon(\sigma_2) \times \varepsilon(\sigma_3) \times \varepsilon(\sigma_4) \\ &= (-1)^4 \times (-1)^4 \times (-1)^2 \times (-1)^3 \\ &= -1. \end{aligned}$$

**Ex 1.15** soient  $\tau_1 = (i, j)$  et  $\tau_2 = (0, \sigma)$  deux transpositions, alors, on a :

si  $\{i, j\} = \{0, \sigma\}$ , alors  $\tau_1 = \tau_2$  et donc

$$\tau_1 \circ \tau_2 = \text{Id}$$

**1154**  $\text{Card}\{i, j, u, v\} = 3$ , alors  $i = u$  par exemple avec  $i, j$  et  $v$  deux à deux distincts, alors

$$\begin{array}{ccc} i & \xrightarrow{z_2} & v & \xrightarrow{z_1} & u \\ j & \longrightarrow & j & \longrightarrow & i \\ v & \longrightarrow & i & \longrightarrow & j \end{array}$$

et donc  $\sigma = z_1 \circ z_2 = (i, v, j)$  (cycle)

d'où  $\sigma^3 = (z_1 \circ z_2)^3 = \text{Id}$ .

**1155**  $\text{Card}\{i, j, u, v\} = 4$ , alors  $\{i, j\} \cap \{u, v\} = \emptyset$   
On a deux cycles à support disjoints commutant et donc

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= (z_1 \circ z_2)^2 = z_1^2 \circ z_2^2 \\ &= \text{Id} \circ \text{Id} \\ &= \text{Id}. \end{aligned}$$

**EX 1.16** À faire en exercice.

**EX 1.17** Remarquons que  $6 \xrightarrow{\sigma} 10 \xrightarrow{\sigma} 6$ , alors

$$\sigma_1 = (10, 6) \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 9 & 4 & 3 & 8 & 7 & 6 & 1 & 2 & 5 & 10 \end{pmatrix}$$

Comme 3, 6 et 10 sont invariants, alors  $\sigma_1$  s'identifie à

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 4 & 8 & 7 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Remarquons que  $\sigma_1(9) = 5$ , alors

$$(9, 5) \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 & 7 & 8 \\ 5 & 4 & 8 & 7 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \sigma_2$$

Remarquons que  $\sigma_2(8) = 2$ , alors

$$(8, 2) \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 & 7 \\ 5 & 4 & 2 & 7 & 1 \end{pmatrix} = \sigma_3$$

Remarquons que  $\sigma_3(7) = 4$ , alors

$$(7, 4) \circ \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \sigma_4$$

Remarque que  $\sigma(5) = 4$ , alors

$$(5, 1) \circ \sigma_4 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = (2, 4)$$

Finalement, on obtient

$$(2, 4) = (5, 1) \circ \sigma_4$$

$$= (5, 1) \circ (7, 1) \circ \sigma_3$$

$$= (5, 1) \circ (7, 1) \circ (8, 2) \circ \sigma_2$$

$$= (5, 1) \circ (7, 1) \circ (8, 2) \circ (9, 5) \circ \sigma_1$$

d'où

$$(2, 4) = (5, 1) \circ (7, 1) \circ (8, 2) \circ (9, 5) \circ (10, 6) \circ \sigma$$

$$\sigma = (10, 6) \circ (9, 5) \circ (8, 2) \circ (7, 1) \circ (5, 1) \circ (2, 4)$$

et donc

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^6 = 1.$$